

**URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE****OPRACOWANIA SYGNALNE**

Lublin, wrzesień 2007 r.

Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl

Internet: <http://www.stat.gov.pl/urzedzylublin/index.htm>

Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61

**POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2007 R.****(bydło i owce stan w końcu maja, trzoda chlewna stan w końcu lipca)**

Źródło informacji o gospodarstwach indywidualnych stanowiły uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i trzody chlewnej, przeprowadzonego na próbie ok. 0,5% gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło i owce oraz ok. 0,7% gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, a o sektorze publicznym i prywatnym (bez gospodarstw indywidualnych) dane sprawozdawcze.

Pogłowie bydła w końcu maja 2007 r. liczyło 424,2 tys. szt i w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku zwiększyło się o 0,6%, natomiast w porównaniu ze stanem w 2004 r. (rok najniższego stanu pogłowia w okresie ostatnich 6 – ciu lat) wzrosło o 7,6%. Odnotowano zwiększenie liczebności cieląt poniżej 1 roku o 1,8% i młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat o 3,8%, a zmniejszenie pogłowia w wieku powyżej 2 lat o 0,7%. Zmieniła się struktura pogłowia bydła. W porównaniu do roku ubiegłego wzrósł udział cieląt w wieku poniżej 1 roku o 0,3 punktu procentowego oraz bydła w wieku od 1 do 2 lat o 0,4 pp, a spadł udział pogłowia w wieku 2 lat i więcej o 0,8 pp. Udział pogłowia krów w stadzie bydła wynosił 53,8% i był najniższy w okresie ostatnich 6 – ciu lat.

Pogłowie owiec w omawianym okresie wyniosło 22,6 tys. szt, tj. o 13,0% mniej niż przed rokiem. Liczebność macierek owczych zmniejszyła się o 16,2%.


W końcu lipca 2007 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 1289,9 tys. szt i w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku zmniejszyło się o 4,0%, a wzrosło o 15,4% w stosunku do 2004 r. (rok najniższego stanu pogłowia w okresie ostatnich 6 – ciu lat). Spadek pogłowia świń odnotowano w odniesieniu do wszystkich grup wagowych, największy w przypadku trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów o 8,3% (w tym loch prośnych o 12,5%) i prosiąt o wadze do 20 kg o 7,4%. W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział warchlaków o 0,9 pp i zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na ubój o 0,7 pp. Zmniejszył się udział prosiąt o 1,1 pp. i zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów o 0,5 pp. Udział loch przeznaczonych na chów w stadzie trzody chlewnej w 2007 r. był najniższy od 2004 r., a loch – od 2003 r.

TABL. 1. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE


Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005	2006	2007
W tys. szt						
Bydło ^a	439,2	425,4	394,1	434,9	421,8	424,2
cielęta poniżej 1 roku	96,0	92,9	93,7	100,2	103,9	105,8
młode bydło w wieku 1 – 2 lat.....	69,6	55,6	52,5	53,9	60,6	62,9
bydło w wieku 2 lat i więcej.....	273,6	276,9	247,9	280,8	257,2	255,5
w tym krowy	261,8	260,7	233,4	258,6	238,2	228,0
Owce ^a	27,1	25,2	26,3	23,5	25,9	22,6
w tym maciorki	15,9	15,8	18,4	16,8	18,8	15,7
Trzoda chlewna ^b	1354,9	1380,6	1118,1	1269,3	1344,1	1289,9
prosięta o wadze do 20 kg.....	489,0	457,5	374,6	419,6	460,3	426,4
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg.....	378,7	357,3	266,6	320,9	325,4	324,2
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej.....	487,2	565,8	476,9	528,7	558,4	539,4
na ubój	.	435,1	354,0	390,9	423,3	415,4
na chów	.	130,7	122,9	137,9	135,1	123,9
w tym lochy.....	150,5	127,3	119,9	134,2	132,3	121,3
w tym prośne	.	79,3	73,7	84,0	80,9	70,8
W odsetkach						
Bydło ^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
cielęta poniżej 1 roku	21,9	21,8	23,8	23,0	24,6	24,9
młode bydło w wieku 1 – 2 lat.....	15,9	13,1	13,3	12,4	14,4	14,8
bydło w wieku 2 lat i więcej.....	62,3	65,1	62,9	64,6	61,0	60,2
w tym krowy	59,6	61,3	59,2	59,5	56,5	53,7
Owce ^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
w tym maciorki	58,6	62,8	70,0	71,6	72,4	69,7
Trzoda chlewna ^b	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
prosięta o wadze do 20 kg.....	36,1	33,1	33,5	33,1	34,2	33,1
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg.....	28,0	25,9	23,8	25,3	24,2	25,1
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej.....	36,0	41,0	42,7	41,7	41,5	41,8
na ubój	.	31,5	31,7	30,8	31,5	32,2
na chów	.	9,5	11,0	10,9	10,1	9,6
w tym lochy.....	11,1	9,2	10,7	10,6	9,8	9,4
w tym prośne	.	5,7	6,6	6,6	6,0	5,5

a Stan w końcu maja. b Stan w końcu lipca.


STRUKTURA STADA BYDŁA



STRUKTURA STADA TRZODY CHLEWNEJ



POGŁÓWIE BYDŁA I KRÓW



POGŁÓWIE TRZODY CHLEWNEJ I LOCH

