

Ziemiołody rolne i ogrodnicze w województwie lubelskim w 2022 roku

Dane wstępne

**0,3%**

Zmniejszenie powierzchni
uprawy zbóż ogółem w 2022 r.
w porównaniu z 2021 r.

W województwie lubelskim według
wynikowego szacunku powierzchnia upraw
zbóż ogółem w 2022 r. była niższa w stosunku
do poprzedniego roku, podobnie jak
powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku,
ziemniaków oraz buraków cukrowych.
Zwiększyła się natomiast powierzchnia uprawy
kukurydzy na ziarno.

Warunki agrometeorologiczne w okresie od jesieni 2021 r. do jesieni 2022 r.

O wysokości plonów upraw rolnych w dużej mierze decydują warunki agrometeorologiczne, tj. temperatura powietrza, ilość i rozkład opadów atmosferycznych oraz nasłonecznienie. Czynniki te, oprócz środków produkcji stosowanych przez rolników, tj. między innymi zastosowanego materiału siewnego, środków ochrony roślin czy zastosowanych nawozów, wpływają na stan i rozwój roślin oraz terminowość wykonywanych prac polowych i zabiegów agrotechnicznych wykonywanych na poszczególnych etapach ich wegetacji.

Zima 2021/22 na terenie całego województwa była łagodna ze średnimi temperaturami w grudniu 2021 r. niższymi od normy z okresu 1991-2020 o 0,7°C, zaś w styczniu i lutym 2022 r. wyższymi odpowiednio o 2,5°C i o 3,8°C. Ze względu na ciepły luty oziminy wznowiły wegetację już pod koniec miesiąca i były w dobrej kondycji. Warunki agrometeorologiczne panujące w marcu sprzyjały rozpoczęciu prac polowych, jednakże zostały wstrzymane na ok. 2 tygodnie ze względu na załamanie pogody na przełomie marca i kwietnia (opady śniegu i temperatura spadła do poziomu minus 7°C).

Kolejne miesiące 2022 r. (maj i czerwiec) były bardzo zróżnicowane pod względem zarówno temperatury, jak i opadów atmosferycznych. Maj był dość ciepły i suchy, a niewielkie opady deszczu i silny wiatr przyczyniły się do nasilenia suszy rolniczej i erozji wietrznej. Czerwiec również był ciepły z temperaturami powietrza ok. 30°C, a bilans wodny nadal był ujemny pomimo, iż występowały gwałtowne burze z opadami deszczu i gradu. Opady były niewystarczające, a grad miejscami wyrządził znaczne szkody w uprawach rolniczych i ogrodniczych.

Lato 2022 r. było ciepłe, jednakże nie brakowało obfitych opadów deszczu. Lipiec był miesiącem ciepłym i deszczowym, w pierwszych tygodniach temperatura oscylowała w granicach 20°C, jednak w ostatniej dekadzie powróciły upały i temperatura przekraczała 30°C. Takie warunki pogodowe sprzyjały rozpoczęciu prac żniwnych. Upały utrzymywały się również w sierpniu, który był upalny i dość suchy. Dopiero pod koniec miesiąca pojawiły się burze z przelotnymi opadami deszczu, które jednak nie poprawiły bilansu wodnego, a na polach widoczne były niedobory wilgoci. Warunki panujące w ciągu miesiąca sprzyjały wykonywaniu prac żniwnych i późniejszych.

Warunki agrometeorologiczne zmieniły się wraz z nadejściem września, który był dość chłodny z temperaturami znacznie poniżej średniej wieloletniej oraz deszczowy, a średnia suma opadów znacznie przekraczała normę wieloletnią. Taka aura zniwelowała niedobory wilgoci w glebie. Na początku października nastąpiła poprawa pogody i można było wznowić prace. Rolnicy kończyli zbiór ziemniaków i kukurydzy na zielonkę oraz kontynuowali zbiór buraków cukrowych, gdyż w drugiej połowie września rozpoczęła się kampania buraczana. Październik był miesiącem dość ciepłym i słonecznym z niewielką ilością opadów, co pozwoliło na prowadzenie jesiennych prac polowych takich jak: zbiory roślin okopowych, soi, kukurydzy na ziarno i buraków cukrowych, siewy ozimin oraz orki zimowe.

31.05.2023 r.

Niekorzystny wpływ na wynik produkcji roślinnej w 2022 r. miało przede wszystkim ochłodzenie i opady śniegu na przełomie marca i kwietnia, które opóźniły wiosenne prace polowe i rozwój roślin, a następnie długo utrzymujące się upały i brak opadów deszczu, które przyczyniły się do występowania suszy rolniczej na terenie województwa.

Produkcja głównych upraw rolnych

Zboża

Stan przezimowania zbóż w lutym 2022 r. rzeczoznawcy rolni ocenili na nieznacznie lepszym poziomie, niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego, co oznacza, że rośliny były w dobrej kondycji. Pogoda panująca w marcu pozwoliła rolnikom na wysianie pierwszej dawki nawozów pod zboża ozime. Prowadząc lustrację w marcu nie zaobserwowano większych uszkodzeń po zimie, jednakże duży problem stanowiły straty wyrządzone przez dziką zwierzynę. Lokalnie na zbożach ozimych zaobserwowano oznaki chorobowe mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej oraz septoriozy liści. W kwietniu stan zbóż ozimych został oceniony na dobry. Znajdowały się one w fazie pierwszego kolanka i nie zaobserwowano na roślinach nasilenia się chorób grzybowych, jednakże widoczne były jaja skrzypionki zbożowej i konieczna była ochrona plantacji. Natomiast w przypadku zbóż jarych wysianych wcześniej, wschody były bardzo nierównomierne ze względu na trudne warunki pogodowe na początku miesiąca.

W maju stan zbóż ozimych był dobry, zaś jarych zadowalający. Zboża ozime znajdowały się w fazie kłoszenia, a pod koniec miesiąca rolnicy wykonali zabiegi grzybobójcze, ponadto konieczna była również ochrona plantacji mająca na celu zwalczenie skrzypionki zbożowej. Zboża jare znajdowały się dopiero w fazie grubienia pochwy liściowej, co było spowodowane opóźnionymi siewami i niekorzystnymi warunkami agrometeorologicznymi. Nie zaobserwowano na nich nasilenia chorób grzybowych i szkodników, a opady deszczu, które wystąpiły pod koniec maja, znacznie poprawiły kondycję plantacji. W czerwcu zboża ozime znajdowały się w fazie kształtowania ziarniaków, a ich stan rzeczoznawcy rolni ocenili na dobry. Natomiast zboża jare znajdowały się w średniej kondycji i podobnie jak na zbożach ozimych zaobserwowano występowanie lokalnie mszyc i skrzypionki zbożowej, a w związku z tym konieczna była ich ochrona.

Żniwa rozpoczęto pod koniec drugiej dekady lipca, a zebrane plony były trochę niższe niż rok wcześniej. Ziarno posiadało wysokie parametry jakościowe przy niskiej wilgotności.

Według wynikowego szacunku powierzchnia upraw **zbóż ogółem** w 2022 r. wyniosła 717,5 tys. ha i była mniejsza o 0,3% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 12,4% w stosunku do 2015 r. Plony zbóż ogółem oszacowano na poziomie 48,5 dt/ha, czyli o 0,8% niższym od uzyskanych rok wcześniej i o 31,1% wyższym niż w 2015 r. Zbiory zbóż ogółem w 2022 r. zmniejszyły się o 1,1% w stosunku do 2021 r., zaś w porównaniu z 2010 r. wzrosły o 15,0% i wyniosły 3 481,1 tys. t.


Tablica 1. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory zbóż

Wyszczególnienie	2015	2020	2021	2022	
	w liczbach bezwzględnych				2021 = 100
OGÓŁEM					
Powierzchnia w tys. ha	818,7	736,9	719,5	717,5	99,7
Plony z 1 ha w dt	37,0	48,5	48,9	48,5	99,2
Zbiory w tys. t	3 027,2	3 570,9	3 521,6	3 481,1	98,9
w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi					
Powierzchnia w tys. ha	764,4	680,2	650,6	620,7	95,4
Plony z 1 ha w dt	37,2	47,8	47,7	46,9	98,3
Zbiory w tys. t	2 846,9	3 255,3	3 104,5	2 908,7	93,7

Łączna powierzchnia **zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi** określona na podstawie wynikowego szacunku w 2022 r. wyniosła 620,7 tys. ha i była o 4,6% mniejsza niż w 2021 r., a uzyskane plony również osiągnęły niższy o 1,7% poziom. W 2022 r. zebrano o 6,3% mniej zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi niż rok wcześniej. Łączna powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zmniejszyła się w stosunku do 2015 r. o 18,8%, natomiast plony i zbiory wzrosły odpowiednio o 25,9% i o 2,2%.

Łączna powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zmniejszyła się w stosunku do 2015 r. o 18,8%, natomiast plony i zbiory wzrosły odpowiednio o 25,9% i o 2,2%.

Wykres 1. Powierzchnia zasiewów i plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi



W maju 2022 r. stan kukurydzy na ziarno rzeczoznawcy rolni ocenili na dobrym poziomie, pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych panujących podczas siewów i przy niedoborze wilgoci w glebie. Wschody były wyrównane, a rośliny siane najwcześniej przekroczyły fazę 4-5 liści. Przełom czerwca i lipca był bardzo upalny, a opady deszczu praktycznie nie występowały, co przyczyniło się do wystąpienia suszy rolniczej, przez co najbardziej ucierpiały między innymi plantacje kukurydzy. Opady deszczu w lipcu poprawiły kondycję plantacji, których stan w sierpniu został oceniony na dobry.

W 2022 r. kukurydzę na ziarno zasiano na powierzchni 76,5 tys. ha, czyli o 56,7% większej niż w roku wcześniejszym. Zbiory natomiast wyniosły 535,6 tys. t i były o 40,7% wyższe niż w 2021 r. Natomiast plony kukurydzy na ziarno w omawianym okresie wyniosły 70,0 dt/ha i tym samym były o 10,8% wyższe od uzyskanych w roku wcześniejszym.

W 2022 r. **plony kukurydzy na ziarno** wyniosły 70,0 dt/ha i tym samym były o 10,8% wyższe od uzyskanych w roku wcześniejszym.

Rzepak i rzepik

Stan przezimowania rzepaku i rzepiku w lutym 2022 r. oceniono na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pogoda panująca w marcu pozwoliła rolnikom na wysianie pierwszej dawki nawozów, a stan plantacji ozimych był dość dobry. Pod koniec miesiąca zaobserwowano przekroczenie progu ekonomicznej szkodliwości chowacza, jednakże wykonanie zabiegów ochronnych było utrudnione ze względu na niekorzystne warunki agrometeorologiczne. Podobnie jak w roku wcześniejszym duży problem stanowiły straty wyrządzone przez dziką zwierzynę. Według stanu na dzień 30 kwietnia na niektórych plantacjach rzepaku zaobserwowano pierwsze szkodniki: chowacza łądowego i stodyszka, w związku z tym konieczna była ochrona plantacji. Rzepak zimowy znajdował się w fazie tuż przed kwitnieniem, a jego wegetacja była lekko opóźniona. W maju stan plantacji rzepaku ozimego został oceniony na dobry i znajdował się w fazie kończenia kwitnienia, a plantacje były dobrze rozkrzewione. Niestety zaobserwowano nasilenie występowania szkodnika stodyszka i szkodników łuszczykowych oraz chorób grzybowych. Natomiast rzepak jary znajdował się w fazie rozwijania pędów kwiatowych na początku fazy kwitnienia, a stan upraw oceniono na średnim poziomie ze względu na niekorzystne warunki pogodowe podczas siewów. W czerwcu rzepak ozimy znajdował się w fazie wzrostu i dojrzewania łuszczyzny, zaś jary w fazie kwitnienia. Stan roślin, w przypadku rzepaku ozimego, został oceniony na dobry, a w przypadku jarego na średni. Sporadycznie występowały szkodniki łuszczykowe, tj. chowacz podobnik, czy pryszczarek kapustnik.

Żniwa rzepaku ozimego rozpoczęły się w pod koniec lipca, jednakże zostały przerywane na ok. tydzień przez obfite opady deszczu i zakończyły się w połowie sierpnia.


Tablica 2. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory rzepaku i rzepiku

Wyszczególnienie	2015	2010	2021	2022	
	w liczbach bezwzględnych			2021 = 100	
OGÓŁEM					
Powierzchnia w tys. ha	65,0	128,4	127,5	125,3	98,3
Plony z 1 ha w dt	24,8	29,8	31,8	33,9	106,6
Zbiory w tys. t	161,5	383,3	405,4	424,9	104,8

W 2022 r. województwie lubelskim **plony rzepaku i rzepiku** oszacowano na wyższym o 6,6% poziomie niż w 2021 r. i o 36,6% w stosunku do 2015 r.

Według wynikowego szacunku powierzchnia upraw rzepaku i rzepiku w 2022 r. wyniosła 125,3 tys. ha i była o 1,7% mniejsza w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast w stosunku do 2015 r. większa o 92,7%. Zbiory natomiast ukształtowały się na poziomie 424,9 tys. t i były o 4,8% wyższe od notowanych w 2021 r. i o 163,2% wyższe niż w 2015 r. W 2022 r. plony rzepaku i rzepiku oszacowano na wyższym o 6,6% poziomie niż w 2021 r. i o 36,6% w stosunku do 2015 r.

Wykres 2. Powierzchnia zasiewów i plony rzepaku i rzepiku



Ziemniaki

Kwiecień 2022 r. był miesiącem dość chłodnym z obfitymi opadami, na początku miesiąca śniegu, a później deszczu. Taka pogoda opóźniła sadzenie ziemniaków i pod koniec maja znajdowały się one dopiero w fazie wschodów, ale już w takim stanie zaobserwowano gdzieś występowanie stonki ziemniaczanej, a plantacje były mocno zachwaszczone. W czerwcu stan upraw został oceniony na dobry. Rośliny znajdowały się w fazie kwitnienia i zakrywania międzyrzędzi. Nadal obserwowano niewielkie nasilenie stonki ziemniaczanej. Opady deszczu w lipcu, a później upały w sierpniu spowodowały występowanie zarazy ziemniaczanej, a na niechronionych plantacjach zasychanie naci. Zbiory ziemniaków rozpoczęto z początkiem września, a zakończono w październiku. Plony były niższe niż rok wcześniej ze względu na suszę, natomiast porażenie chorobami grzybowymi było większe niż rok wcześniej, co mogło powodować problemy z przechowywaniem bulw.

Tablica 3. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory ziemniaków


Wyszczególnienie	2015	2020	2021	2022	
		w liczbach bezwzględnych			2021 = 100
OGÓŁEM					
Powierzchnia w tys. ha	21,3	11,7	11,6	9,9	85,4
Plony z 1 ha w dt	214	398	346,0	324,0	93,6
Zbiory w tys. t	456,0	467,0	402,1	321,1	79,9

Według wynikowego szacunku powierzchnia upraw ziemniaków w 2022 r. zmniejszyła się zarówno w stosunku do 2021 r., jak i 2015 r., odpowiednio o 14,6% i o 53,4%. W omawianym okresie zebrano o 20,1% mniej ziemniaków niż w 2021 r. i o 29,6% niż w 2015 r.

W 2022 r. uzyskane w województwie lubelskim plony ziemniaków były o 6,4% niższe niż w roku wcześniejszym, natomiast o 51,4% wyższe niż w 2015 r.

W 2022 r. uzyskane **plony ziemniaków** w województwie lubelskim były o 6,4% niższe niż w 2021 r., natomiast o 51,4% wyższe niż w 2015 r.

Wykres 3. Powierzchnia zasiewów i plony ziemniaków



Buraki cukrowe

Kwiecień 2022 r. był miesiącem dość chłodnym z obfitymi opadami, na początku miesiąca śniegu a później deszczu, co przyczyniło się do opóźnienia siewów buraków cukrowych. Rośliny wysiane wcześniej cechowały się bardzo nierównomiernymi wschodami, co było spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi na początku miesiąca. Jednakże ostatnie dni kwietnia były bardzo ciepłe i przyczyniły się do przyspieszenia wegetacji. W czerwcu stan plantacji został oceniony na średnim poziomie. Pod koniec miesiąca znajdowały się one w fazie zakrywania międzyrzędzi, jednakże wysokie temperatury i brak opadu deszczu niekorzystnie wpływały na kondycję roślin. Zaobserwowano lokalnie występowanie mszyc.

W lipcu stan upraw był dobry, natomiast warunki pogodowe w sierpniu, tj. wysoka wilgotność i wysokie temperatury powietrza zarówno w dzień, jak i w nocy, przyczyniły się do dynamicznego rozwoju chwościka na większości plantacji.

Z początkiem września rozpoczęto zbiory buraków cukrowych i tym samym ruszyła kampania buraczana w cukrowniach. Słoneczna aura w październiku sprzyjała zbiorom i gromadzeniu cukru, a więc wydaniu wyższego plonu korzeni o lepszej jakości.

Pod koniec października większość buraków cukrowych została już zebrana i na ich podstawie szacowano, że polaryzacja cukru wynosiła ok. 17%, a plony były zadowalające.


Tablica 4. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory buraków cukrowych

Wyszczególnienie	2015	2020	2021	2022	
	w liczbach bezwzględnych				2021 = 100
OGÓŁEM					
Powierzchnia w tys. ha	32,3	35,7	31,8	25,5	80,3
Plony z 1 ha w dt	518	540,4	542,1	651,2	120,2
Zbiory w tys. t	1 674,6	1 928,0	1 725,7	1 663,5	96,4

W województwie lubelskim **plony buraków cukrowych** w 2022 r. oszacowano na wyższym poziomie zarówno w stosunku do 2021 r., jak i 2015 r., odpowiednio o 20,2% i o 25,7%.

Powierzchnia upraw **buraków cukrowych** w 2022 r. zmniejszyła się zarówno w stosunku do roku poprzedniego, jak i 2015 r. odpowiednio o 19,7% i o 20,9%. Zbiory również zmniejszyły się w stosunku do 2021 r. o 3,6% i o 0,7% w porównaniu z 2015 r. Jednocześnie plony buraków cukrowych w 2022 r. oszacowano na wyższym poziomie zarówno w stosunku do 2021 r., jak i 2015 r. odpowiednio o 20,2% i o 25,7%.

Wykres 4. Powierzchnia zasiewów i plony buraków cukrowych



Produkcja głównych upraw ogrodniczych

Kwiecień 2022 r. był miesiącem dość chłodnym z obfitymi opadami, na początku miesiąca śniegu a później deszczu. Taka pogoda opóźniła siew warzyw gruntowych.

Tablica 5. Zbiory warzyw gruntowych

Wyszczególnienie	2015	2020	2021	2022	
	w tysiącach ton				2021 = 100
Ogółem	364,7	447,6	507,7	634,6	125,0
kapusta	48,5	28,3	26,1	30,0	115,0
kalafior	22,7	21,9	26,5	27,2	102,7
cebula	32,3	23,2	27,3	26,0	95,2
marchew jadalna	81,7	97,0	95,5	102,5	107,4
burak ćwikłowy	33,5	41,4	39,2	39,9	101,6
ogórek gruntowy	20,7	13,6	9,5	9,9	105,1
pomidor gruntowy	29,3	32,9	28,6	30,1	105,1
pozostałe ^a	96,0	189,4	255,0	369,0	144,7

a Pory, pietruszka, selery, papryka, rzodkiewka, sałata i inne.

Zbiory były większe w porównaniu z rokiem wcześniejszym, jak i 2015 r., odpowiednio o 25,0% i o 74,0%. Największy udział w zbiorach warzyw gruntowych w 2022 r. stanowiły zbiory marchwi jadalnej (16,2%) oraz buraków ćwikłowych (6,3%).

Warunki agrometeorologiczne panujące w marcu 2022 r. były korzystne dla większości upraw sadowniczych, jednakże koniec miesiąca i początek następnego przyniosły załamanie pogody. Opady śniegu i niskie temperatury spowolniły tempo rozwoju poszczególnych gatunków roślin.

W marcu 2022 r. kondycję **drzew owocowych** rzeczoznawcy ocenili na dobrym poziomie. **Maliny letnie i jesienne** według stanu na koniec marca wyglądały dość dobrze, podobnie **porzeczki**, które przetrzymały dobrze i były już w bardzo zaawansowanej fazie rozwoju. **Truskawki** także przetrzymały dość dobrze.

W kwietniu, jak i w maju stan upraw sadowniczych był dobry. Maj był miesiącem mocno zróżnicowanym pod względem pogody, gdyż występowały naprzemiennie wyższe i niższe temperatury. Kwitnienie **drzew owocowych** wydłużyło się, jednakże było obfite. Natomiast spowolniona została wegetacja **krzewów owocowych**, a ich rozwój był opóźniony. Następnie zostały one dotknięte suszą rolniczą spowodowaną warunkami agrometeorologicznymi panującymi na przełomie czerwca i lipca. Dopiero opady deszczu w lipcu nieznacznie poprawiły bilans wodny, jednakże sierpień był znowu gorący i suchy.

W województwie lubelskim **zbiory warzyw gruntowych** w 2022 r. były wyższe o 25,0% w porównaniu z rokiem wcześniejszym i o 74,0% w stosunku do 2015 r.

Tablica 6. Zbiory owoców

Wyszczególnienie	2015	2020	2021	2022	
	w tysiącach ton				2021 = 100
Ogółem z drzew	542,7	573,7	611,0	580,4	95,0
w tym jabłonie	478,7	513,6	547,4	509,7	93,1
śliwy	13,3	15,8	19,7	21,7	110,2
wiśnie	38,8	30,7	31,1	31,3	100,6
Ogółem z krzewów i plantacji jagodowych	218,2	216,1	203,4	206,2	101,4
w tym maliny ^a	62,7	90,5	79,0	78,2	99,0
porzeczki ogółem	77,6	59,6	52,7	60,5	114,8

a łącznie z jeżyną bezkolcowa

Zbiory **owoców z drzew z sadów** w 2022 r. zmniejszyły się o 5,0% w stosunku do 2021 r., natomiast wzrosły w porównaniu z 2015 r. o 7,0%. W strukturze zbiorów dominowały jabłka, które stanowiły 87,8% ogółu owoców zebranych z drzew owocowych. W stosunku do 2021 r. odnotowano zmniejszenie się produkcji jabłek o 6,9%, a w porównaniu z 2015 r. wzrost o 6,5%.

Z krzewów i plantacji jagodowych w 2022 r. zebrano 206,2 tys. t owoców, czyli więcej o 1,4% niż rok wcześniej, zaś mniej o 5,5% niż w 2015 r. Największy udział w produkcji owoców jagodowych w województwie lubelskim w 2022 r. miały maliny łącznie z jeżyną bezkolcową (37,9%), porzeczki ogółem (29,3%) oraz truskawki i poziomki gruntowe (16,0%).

W województwie lubelskim **zbiory owoców z drzew** w 2022 r. były niższe o 5,0% w stosunku do 2021 r., zaś w porównaniu z 2015 r. wyższe o 7,0%

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Lublinie

Dyrektor Krzysztof Markowski
Tel: 81 533 20 51

Rozpowszechnianie:
Informatorium Statystyczne

Tel: 81 533 27 14

Osoba ds. kontaktów z mediami

Elżbieta Łoś
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych

Tel: 81 465 20 28

e-mail: e.los@stat.gov.pl



lublin.stat.gov.pl



@LUBLIN_STAT



@UrządStatystycznyLublin

Powiązane opracowania

[Charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 2020](#)

[Ziemioptody rolne i ogrodnicze w województwie lubelskim w 2021 r.](#)

Temat dostępny w bazach danych

[Bank Danych Lokalnych](#)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

[Powierzchnia upraw zbożowych](#)

[Zbiór \(plonów\)](#)

[Plon z 1 ha w dt](#)